

(des-KOH-vee)

INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE SOBRE DESCOVY

DESCOVY podría causar efectos secundarios graves, que incluyen los siguientes:

- **Empeoramiento de la hepatitis B (VHB).** Tu proveedor de atención médica te hará la prueba de VHB. Si tienes VIH-1 y VHB, tu VHB podría empeorar repentinamente si dejas de tomar DESCOVY. No dejes de tomar DESCOVY sin hablar primero con tu proveedor de atención médica, ya que deberá monitorear tu salud de forma regular durante varios meses o darte un medicamento para tu VHB.

ACERCA DE DESCOVY

- DESCOVY es un medicamento de venta con receta que se toma junto con otros medicamentos para tratar el VIH-1 en personas que pesan al menos 77 libras (35 kg).
- **DESCOVY no cura el VIH-1 ni el SIDA.** El VIH-1 es el virus que causa el SIDA.

ANTES DE TOMAR DESCOVY

Informa a tu proveedor de atención médica si:

- Tienes o has tenido algún problema renal o hepático, incluida la hepatitis.
- Tienes cualquier otra afección.
- Estás embarazada o planeas quedar embarazada.
- Estás amamantando (lactando) o planeas amamantar. DESCOVY pasa a tu bebé a través de la leche materna. Habla con tu proveedor de atención médica sobre los riesgos de amamantar durante el tratamiento con DESCOVY.

Informa a tu proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que tomas:

- Elabora una lista que incluya todos los medicamentos de venta con y sin receta, vitaminas y suplementos herbales, y muéstrasela a tu proveedor de atención médica y al farmacéutico.
- Pregúntale a tu proveedor de atención médica o al farmacéutico sobre los medicamentos que no se deben tomar con DESCOVY.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Esto es sólo un breve resumen de información importante sobre DESCOVY[®] y no sustituye la conversación con tu proveedor de atención médica sobre tu afección y tu tratamiento.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE DESCOVY

DESCOVY puede causar efectos secundarios graves, que incluyen los siguientes:

- Aquellos que se describen en la sección “Información muy importante sobre DESCOVY”.
- Cambios en tu sistema inmunológico.
- Problemas renales nuevos o que empeoran, incluida la insuficiencia renal.
- Demasiado ácido láctico en la sangre (acidosis láctica), que es una emergencia médica grave pero poco frecuente y que puede provocar la muerte. Informa a tu proveedor de atención médica de inmediato si tienes estos síntomas: debilidad o más cansancio que lo habitual, dolor muscular inusual, dificultad para respirar o respiración acelerada, dolor estomacal con náuseas y vómitos, manos y pies fríos o azulados, mareos o aturdimiento, o palpitaciones o latidos anormales.
- Problemas hepáticos graves, que en casos poco frecuentes pueden provocar la muerte. Informa a tu proveedor de atención médica de inmediato si tienes estos síntomas: color amarillento en la piel o la parte blanca de los ojos, orina oscura “color té”, heces claras, pérdida de apetito durante varios días o más, náuseas o dolor en la región estomacal.

El efecto secundario más común de DESCOVY es náuseas.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de DESCOVY. Informa a tu proveedor de atención médica de inmediato si tienes algún síntoma nuevo mientras tomas DESCOVY.

Tu proveedor de atención médica deberá realizarte pruebas para monitorear tu salud antes y durante el tratamiento con DESCOVY.

CÓMO TOMAR DESCOVY

- DESCOVY es un comprimido que se toma una vez al día para tratar el VIH-1 junto con otros medicamentos para el VIH-1.
- Toma DESCOVY con o sin alimentos.

OBTÉN MÁS INFORMACIÓN

- Esto es sólo un breve resumen de la información importante sobre DESCOVY. Habla con tu proveedor de atención médica o farmacéutico para aprender más.
- Visita DESCOVY.com o llama al 1-800-GILEAD-5.
- Si necesitas ayuda para pagar tus medicamentos, visita DESCOVY.com para obtener información sobre el programa.