

SEGUIRÉ BRILLANDO.

Porque soy lo que soy.

El VIH no discrimina, pero tampoco me define.

Pregunta a tu proveedor de atención médica si BIKTARVY® es adecuado para ti.

BIKTARVY es un medicamento de venta con receta completo de 1 pastilla que se toma una vez al día, y que se usa para tratar el VIH-1 en ciertos adultos. **BIKTARVY no cura el VIH-1 ni el SIDA.**



BIKTARVY®
bictegravir 50mg/emtricitabine 200mg/
tenofovir alafenamide 25mg tablets

Haz clic para consultar la Información Importante acerca de BIKTARVY®, que incluye advertencias importantes sobre el empeoramiento de la hepatitis B, en la página 22.



Índice

Vivir con VIH	3
Acerca de BIKTARVY®	4
Estudios sobre BIKTARVY	5
Inicio del tratamiento	6
Cambiar de tratamiento	9
Reinicio del tratamiento con BIKTARVY	10
Entender la resistencia	13
Posibles efectos secundarios	17
Colabora con tu proveedor de atención médica	18
Tú vienes primero	19
Apoyo y recursos	20



BIKTARVY®
bictegravir 50mg/emtricitabine 200mg/
tenofovir alafenamide 25mg tablets

Haz clic para consultar la Información Importante acerca de BIKTARVY®, que incluye advertencias importantes sobre BIKTARVY, en la página 22.

Seguiré brillando porque soy lo que soy

El VIH no discrimina, pero tampoco me define.

Cuando se toma según lo recetado, el tratamiento para el VIH puede ayudarte a alcanzar y mantener niveles indetectables, para que **puedas seguir brillando**.

Los medicamentos actuales han ayudado a las personas a tener una vida saludable con VIH. Aunque no hay cura para el VIH, encontrar un tratamiento adecuado para ti puede ayudar a contener el virus. No esperes para hablar con tu proveedor de atención médica. Conversa sobre tus opciones de tratamiento en cuanto recibas tu diagnóstico.

Tomar tu medicamento para el VIH según lo recetado ayuda al cuerpo a combatir el VIH.

- ◆ Los medicamentos para el VIH pueden reducir la cantidad de virus en la sangre **hasta niveles indetectables**. Eso significa que la cantidad de virus es tan baja que no se puede medir en una prueba de laboratorio.
- ◆ Reducir la cantidad de virus en la sangre ayuda a aumentar el número de células T CD4 (el número de células que combaten las infecciones en el cuerpo), lo que fortalece el sistema inmunológico.

| = |

Indetectable = Intransmisible

Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (DHHS, por sus siglas en inglés), tomar el tratamiento para el VIH según lo recetado y alcanzar y mantener niveles indetectables evita transmitir el VIH a través del sexo.

Para obtener más información sobre cómo vivir con VIH, haz clic [aquí](#).



Recuerda, toma tus medicamentos para el VIH según lo recetado por tu proveedor de atención médica. Esto te ayuda a tener una vida saludable con VIH y a mantener niveles indetectables del virus.



BIKTARVY®

bictegravir 50mg/emtricitabine 200mg/
tenofovir alafenamide 25mg tablets

Haz clic para consultar la Información Importante acerca de **BIKTARVY®**, que incluye advertencias importantes sobre BIKTARVY, en la página 22.

“Soy mucho más que mi diagnóstico. Forma parte de mi vida, pero no lo es todo”.

D'Eva

Se cambió a BIKTARVY® hace 6 años, aún mantiene niveles indetectables

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Qué es lo más importante que debo saber acerca de BIKTARVY®?

BIKTARVY podría causar efectos secundarios graves:

- ◆ **Empeoramiento de la hepatitis B (VHB).** Tu proveedor de atención médica te hará la prueba de VHB. Si tienes VIH-1 y VHB y dejas de tomar BIKTARVY, tu VHB podría empeorar repentinamente. No dejes de tomar BIKTARVY sin hablar primero con tu proveedor de atención médica, ya que deberá monitorear tu salud y podría darte un medicamento para tu VHB.



BIKTARVY®

bictegravir 50mg/emtricitabine 200mg/
tenofovir alafenamide 25mg tablets

Aprende más sobre el tratamiento **n.º 1 recetado** para el VIH

Fuente: IQVIA LAAD, de julio de 2018 a julio de 2024*.

Más de 430,000 personas en los Estados Unidos toman BIKTARVY® como un tratamiento para el VIH.

Fuente: IQVIA LAAD, de marzo de 2021 a julio de 2024†.

BIKTARVY:



Este no es el tamaño real (15 mm x 8 mm)

- ◆ Es un tratamiento completo para el VIH-1
- ◆ Es 1 pastilla pequeña
- ◆ Se toma una vez al día, a cualquier hora del día
- ◆ Se toma con o sin alimentos
- ◆ Se puede llevar a cualquier parte

Toma BIKTARVY exactamente como te indique tu proveedor de atención médica, y no te saltes ninguna dosis. No cambies la dosis ni dejes de tomar BIKTARVY sin hablar antes con tu proveedor de atención médica.

BIKTARVY es un medicamento de venta con receta para adultos y niños con VIH-1 que pesen al menos 31 libras (14 kg) y que:

- ◆ son personas nuevas en el tratamiento para el VIH-1
- ◆ han recibido medicamentos para el VIH-1 en el pasado

O BIEN

- ◆ están reemplazando su tratamiento actual
- ◆ Para los adultos y niños que recibieron medicamentos para el VIH-1 en el pasado o que están reemplazando sus medicamentos para el VIH-1 actuales, su proveedor de atención médica debe determinar si cumplen con ciertos requisitos.

BIKTARVY no cura el VIH-1 ni el SIDA. El VIH es el virus que causa el SIDA.

Los niños que pesan entre 31 y 55 libras (entre 14 y 24 kg) toman un comprimido de dosis más baja de BIKTARVY que contiene 30 mg de bictegravir, 120 mg de emtricitabina y 15 mg de tenofovir alafenamida una vez al día con o sin alimentos.

Pregunta a tu proveedor de atención médica si BIKTARVY es adecuado para ti.

*Esta información es un cálculo estimado que proviene del uso de la información bajo licencia del siguiente servicio de información de IQVIA: IQVIA LAAD, para el período comprendido entre julio de 2018 y julio de 2024. IQVIA se reserva expresamente todos los derechos, incluidos los derechos de copia, distribución y reimpresión.

†Esta información es un cálculo estimado que proviene del uso de la información bajo licencia del siguiente servicio de información de IQVIA: IQVIA LAAD, para el período comprendido entre marzo de 2021 y julio de 2024. IQVIA se reserva expresamente todos los derechos, incluidos los derechos de copia, distribución y reimpresión.

Haz clic para consultar la Información Importante acerca de BIKTARVY®, que incluye advertencias importantes sobre BIKTARVY, en la página 22.



“No tenía ni idea de que había otras personas como yo, viviendo sus vidas”.

Theron

Se cambió a BIKTARVY® en 2020, aún mantiene niveles indetectables

Un **tratamiento** estudiado pensando en ti

BIKTARVY® se probó de manera exhaustiva en 9 ensayos clínicos con más de 3,600 participantes.

El VIH puede afectar a cualquiera. BIKTARVY se estudió en grupos diversos de personas, como:



Personas que son **nuevas comenzando** un tratamiento



Personas que **se cambiaron** de otro tratamiento luego de alcanzar niveles indetectables



Varias **razas y orígenes étnicos**



Personas de **3 a 80 años de edad**



Personas **embarazadas**



Personas con **niveles altos de VIH** en la sangre



Personas con un **nivel bajo de CD4**



Personas que tienen **VIH resistente** a ciertos tipos de medicamentos

Estudiado teniendo en cuenta la resistencia

A veces el VIH puede cambiar o mutar. Este cambio puede hacer que tus medicamentos no funcionen tan bien. **Esto se denomina *mutación de resistencia* o *resistencia al tratamiento***. Es importante comprender qué es la resistencia y cómo puede afectar tu tratamiento para el VIH.

Puedes obtener más información sobre cómo se diseñaron los estudios de BIKTARVY en la [página 7](#), y por qué es importante la resistencia en la [página 13](#).



BIKTARVY®

bictegravir 50mg/emtricitabine 200mg/
tenofovir alafenamide 25mg tablets

Haz clic para consultar la Información Importante acerca de **BIKTARVY®**, que incluye advertencias importantes sobre BIKTARVY, en la [página 22](#).

Comenzar el tratamiento para el VIH

Cuando te diagnostican VIH, es importante iniciar el tratamiento de inmediato.

Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (DHHS, por sus siglas en inglés), muchos pacientes pueden alcanzar niveles indetectables tan rápido como entre 8 y 24 semanas, cuando realizan el tratamiento según lo recetado. **Algunas personas incluso pueden comenzar el tratamiento el mismo día del diagnóstico.**

El tratamiento para el VIH, cuando se toma según lo recetado, podría reducir la cantidad de VIH en el cuerpo hasta lograr niveles indetectables. Mantener niveles indetectables puede ayudarte a tener una vida saludable con VIH.



QUÉ ESPERAR AL INICIAR EL TRATAMIENTO

Algunos pacientes podrían empezar a tomar BIKTARVY® de inmediato. Antes de iniciar el tratamiento, tu proveedor de atención médica te hará algunas pruebas para asegurarse de que sea adecuado para tus necesidades. Estas pruebas incluirán:

- Realizar pruebas de detección de la hepatitis B
- Determinar si tu VIH es resistente a algún medicamento
- Medir tu recuento de CD4
- Medirte la cantidad de virus del VIH en la sangre

Pregúntale a tu proveedor de atención médica si puedes empezar a tomar BIKTARVY de inmediato, incluso el mismo día del diagnóstico. Iniciar el tratamiento para VIH-1 es una decisión importante. Tu proveedor de atención médica te ayudará a determinar si BIKTARVY es adecuado para ti.



Recordatorios importantes:

- No cambies la dosis ni dejes de tomar BIKTARVY sin hablar antes con tu proveedor de atención médica.
- Mantente bajo el cuidado de un proveedor de atención médica mientras tomas BIKTARVY.



BIKTARVY®

bictegravir 50mg/emtricitabine 200mg/
tenofovir alafenamide 25mg tablets

Tamera

Empezó a tomar BIKTARVY® en 2018, aún mantiene niveles indetectables

La persona destacada toma BIKTARVY y es compensada por Gilead.

INICIO DEL TRATAMIENTO

COMPRENDER LOS DISTINTOS TIPOS DE TRATAMIENTOS

De qué forma actúan en conjunto los distintos tipos de medicamentos para el VIH para combatir el virus.

Clases de medicamentos

Los medicamentos para el VIH se agrupan en distintas clases según cómo combaten el VIH. Los regímenes de tratamiento para el VIH completos combinan más de una clase de medicamentos para combatir el VIH.

Inhibidor de la transferencia de cadena por la integrasa (INSTI, por sus siglas en inglés)

Los INSTI son una clase de medicamentos que se usan para combatir el VIH en una parte determinada del ciclo de vida del VIH. **BIKTARVY es el único tratamiento que contiene el INSTI bictegravir.**

Tratamiento de régimen de un solo comprimido (STR, por sus siglas en inglés)

El régimen de un solo comprimido es un tratamiento para el VIH en el que todos los medicamentos que necesitas se combinan en un solo comprimido.

BIKTARVY® es el único STR basado en INSTI recomendado por las pautas del DHHS para iniciar el mismo día para quienes cumplan con ciertos requisitos.

Haz clic para consultar la Información Importante acerca de BIKTARVY®, que incluye advertencias importantes sobre BIKTARVY, en la página 22.

Experiencia **comprobada** en ensayos clínicos


BIKTARVY® demostró su eficacia en amplios ensayos clínicos entre personas que eran nuevas en el tratamiento.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS

Estudio 1489 y Estudio 1490 | 5 años



Dos estudios incluyeron a más de 1,200 adultos nuevos en el tratamiento para el VIH-1.



RESULTADOS

Ambos puntos cronológicos del estudio clínico, el de 3 años y el de 5 años, demostraron que la mayoría de los adultos nuevos en el tratamiento con BIKTARVY que lo tomaron según lo recetado alcanzaron y mantuvieron niveles indetectables (menos de 50 copias/ml).

¹En un ensayo, el otro tratamiento fue TRIUMEQ® (abacavir, dolutegravir, lamivudina). En el otro ensayo, el otro tratamiento fue DESCOVY® (emtricitabina, tenofovir alafenamida) + TIVICAY® (dolutegravir).



Haz clic para consultar la Información Importante acerca de BIKTARVY®, que incluye advertencias importantes sobre BIKTARVY, en la página 22.

“Soy resiliente, tengo esperanza y poder, y siento orgullo de que me definan por lo que soy y por lo que defiendo”.

Chad

Empezó a tomar BIKTARVY® en 2018, aún mantiene niveles indetectables

INICIO DEL TRATAMIENTO

¿Quiénes no deben tomar BIKTARVY®?

No tomes BIKTARVY si tomas:

- ♦ dofetilida
- ♦ rifampicina
- ♦ cualquier otro medicamento para tratar el VIH-1

¿Cuáles son los otros posibles efectos secundarios de BIKTARVY?

Los efectos secundarios graves de BIKTARVY también podrían incluir los siguientes:

- ♦ **Cambios en tu sistema inmunológico.** Tu sistema inmunológico podría fortalecerse y comenzar a combatir infecciones que podrían haber estado ocultas en tu cuerpo. Informa a tu proveedor de atención médica si tienes algún síntoma nuevo después de comenzar a tomar BIKTARVY.

Resultados comprobados

Se comprobó su eficacia para personas nuevas en el tratamiento para el VIH en 2 ensayos clínicos.



EN AMBOS ENSAYOS:

Aproximadamente 9 de cada 10 personas

que viven con VIH y que iniciaron el tratamiento con BIKTARVY® alcanzaron niveles indetectables.

1
año

Estudio 1489

El 92 % (290 de 314) de las personas que tomaron BIKTARVY alcanzaron niveles indetectables, frente al 93 % (293 de 315) de las personas que tomaron TRIUMEQ®.

Estudio 1490

El 89 % (286 de 320) de las personas que tomaron BIKTARVY alcanzaron niveles indetectables, frente al 93 % (302 de 325) de las personas que tomaron DESCOVY® + TIVICAY®.

3
años

8 de cada 10 personas

que viven con VIH y que eran nuevas en el tratamiento con BIKTARVY alcanzaron niveles indetectables.

Estudio 1489

El 82 % (256 de 314) de las personas que tomaron BIKTARVY alcanzaron niveles indetectables, frente al 84 % (265 de 315) de las personas que tomaron TRIUMEQ.

Estudio 1490

El 81 % (262 de 320) de las personas que tomaron BIKTARVY alcanzaron niveles indetectables, frente al 84 % (273 de 325) de las personas que tomaron DESCOVY + TIVICAY.

5
años

A los 5 años, la mayoría de los adultos nuevos en el tratamiento con BIKTARVY que lo tomaron según lo recetado, **alcanzaron y mantuvieron niveles indetectables.**

Colabora siempre con tu proveedor de atención médica para decidir qué medicamento es adecuado para ti. Obtén más información acerca de estos estudios e Información Importante de Seguridad acerca de BIKTARVY en la [página 17](#).



BIKTARVY®

bictegravir 50mg/emtricitabine 200mg/
tenofovir alafenamide 25mg tablets

Haz clic para consultar la Información Importante acerca de BIKTARVY®, que incluye advertencias importantes sobre BIKTARVY, en la [página 22](#).

INICIO DEL TRATAMIENTO



“Estoy en un momento en que puedo ser quien soy y estar orgulloso de eso. Seguir un tratamiento y mantener niveles indetectables es importante para mí”.

Elias

Toma BIKTARVY® desde hace 6 años

Los efectos secundarios graves de BIKTARVY® también podrían incluir los siguientes: (continuación)

- ◆ **Problemas renales, incluyendo insuficiencia renal.** Tu proveedor de atención médica debe realizarte análisis de sangre y orina para controlar tus riñones. Si desarrollas problemas renales nuevos o que empeoran, tu proveedor de atención médica podría indicarte que dejes de tomar BIKTARVY.
- ◆ **Demasiado ácido láctico en la sangre (acidosis láctica),** que es una emergencia médica grave pero poco frecuente y que puede provocar la muerte. Informa a tu proveedor de atención médica de inmediato si tienes estos síntomas: debilidad o más cansancio que lo habitual, dolor muscular inusual, dificultad para respirar o respiración acelerada, dolor estomacal con náuseas y vómitos, manos y pies fríos o azulados, mareos o aturdimiento, o palpitaciones o latidos anormales.

Más personas **se cambiaron**

a BIKTARVY® que a cualquier otro tratamiento para el VIH.

Fuente: IQVIA LAAD, de julio de 2018 a julio de 2024*.

Habla con tu médico sobre si cambiar a BIKTARVY puede ayudarte a mantener niveles indetectables.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS

Estudio 1844 | 3 años



RESULTADOS

Al cabo de 1 año, aproximadamente 9 de cada 10 personas (94 %, 264 de 282) que tenían niveles indetectables con otro tratamiento **mantuvieron niveles indetectables cuando se cambiaron a BIKTARVY**. De las personas que continuaron su tratamiento actual, aproximadamente 9 de cada 10 (95 %, 267 de 281) mantuvieron niveles indetectables al cabo de 1 año.

Ambos puntos cronológicos, el de 1 año y el de 3 años, demostraron que la mayoría de los adultos que reemplazaron su tratamiento actual por BIKTARVY y tomaron el tratamiento según lo recetado **mantuvieron niveles indetectables**.

Los efectos secundarios graves de BIKTARVY® también podrían incluir los siguientes: (continuación)

- ◆ **Problemas hepáticos graves**, que en casos poco frecuentes pueden provocar la muerte. Informa a tu proveedor de atención médica de inmediato si tienes estos síntomas: color amarillento en la piel o la parte blanca de los ojos, orina oscura “color té”, heces claras, pérdida del apetito durante varios días o más, náuseas o dolor en la región estomacal.

Los efectos secundarios más comunes de BIKTARVY en estudios clínicos fueron diarrea (6 %), náuseas (6 %) y dolor de cabeza (5 %). Informa a tu proveedor de atención médica si tienes efectos secundarios que te causan malestar o no desaparecen.

Cambiar tu tratamiento para el VIH es una decisión importante. Trabaja siempre con tu proveedor de atención médica para decidir qué medicamento es adecuado para ti.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS

Estudio 1878 | 2 años



RESULTADOS

Al cabo de 1 año, aproximadamente 9 de cada 10 personas (92 %, 267 de 290) que tenían niveles indetectables con otro tratamiento **mantuvieron niveles indetectables cuando se cambiaron a BIKTARVY**. De las personas que continuaron su tratamiento actual, aproximadamente 9 de cada 10 (89 %, 255 de 287) mantuvieron niveles indetectables al cabo de 1 año.

Ambos puntos cronológicos, el de 1 año y el de 2 años demostraron que la mayoría de los adultos que reemplazaron su tratamiento actual por BIKTARVY y tomaron el tratamiento según lo recetado **mantuvieron niveles indetectables**.

Trabaja siempre con tu proveedor de atención médica para decidir qué medicamento es adecuado para ti. Obtén más información acerca de estos estudios e Información Importante de Seguridad acerca de BIKTARVY en la [página 17](#).

*Esta información es un cálculo estimado que proviene del uso de la información bajo licencia del siguiente servicio de información de IQVIA: IQVIA LAAD, para el período comprendido entre julio de 2018 y julio de 2024. IQVIA se reserva expresamente todos los derechos, incluidos los derechos de copia, distribución y reimpresión.

^{II}El tratamiento continuado fue TRIUMEQ (abacavir, dolutegravir, lamivudina).

^ILos tratamientos continuados fueron una combinación de EPZICOM® (abacavir, lamivudina) o TRUVADA® (emtricitabina, tenofovir disoproxil fumarato) + atazanavir o darunavir (con cobicistat o ritonavir).



BIKTARVY®

bictegravir 50mg/emtricitabine 200mg/
tenofovir alafenamide 25mg tablets

Haz clic para consultar la Información Importante acerca de BIKTARVY®, que incluye advertencias importantes sobre BIKTARVY, en la [página 22](#).

¿Listo para empezar de nuevo?

Si actualmente no estás en tratamiento, BIKTARVY podría ser una opción para ti.

No importa cuáles fueron los desafíos que se presentaron durante tu tratamiento para el VIH, **ten una conversación abierta y honesta con tu proveedor de atención médica sobre los motivos de la interrupción**, para que puedan determinar juntos los pasos a seguir más adecuados para ti.



Estos son algunos temas que deberías considerar y hablar con tu proveedor de atención médica si fueron parte de las razones por las que interrumpiste tu tratamiento:

- ♦ Los efectos secundarios
- ♦ Tu salud mental
- ♦ El tamaño o la cantidad de pastillas
- ♦ Tus necesidades alimentarias
- ♦ Dificultad para asistir a tus citas médicas
- ♦ El costo del medicamento
- ♦ Cambios en tu situación de vida



Recuerda que no estás solo. Tu equipo de atención médica puede ayudarte

No importa si solo estás pensando en reiniciar tu tratamiento o si ya estás listo para empezar de nuevo, ten en cuenta que **hay muchos proveedores de atención médica dispuestos a apoyarte, tales como:**

- ♦ Administradores de casos
- ♦ Trabajadores sociales
- ♦ Personal de enfermería
- ♦ Consejeros
- ♦ Farmacéuticos
- ♦ Promotores de la salud



Phil

Se cambió a BIKTARVY® en 2019, aún mantiene niveles indetectables



Ya sea que estés comenzando, cambiando o reiniciando el tratamiento, BIKTARVY podría ser adecuado para ti

BIKTARVY es la **primera y única pastilla única que se toma una vez al día** que ha recibido una **aprobación adicional por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés)** para su uso en **personas con VIH que reinician el tratamiento**, cuando sea apropiado.

Pregunta a tu proveedor de atención médica si BIKTARVY podría ser adecuado para ti al reiniciar el tratamiento para el VIH-1.

¿Qué le debo informar a mi proveedor de atención médica antes de tomar BIKTARVY?

- ♦ **Todos tus problemas de salud.** Asegúrate de informarle a tu proveedor de atención médica si tienes o has tenido algún problema renal o hepático, incluido el virus de la hepatitis.
- ♦ **Todos los medicamentos que tomas**, incluidos los medicamentos de venta con y sin receta, los antiácidos, los laxantes, las vitaminas y los suplementos herbales. BIKTARVY y otros medicamentos podrían afectarse entre sí. Elabora una lista de todos tus medicamentos y muéstrasela a tu proveedor de atención médica y al farmacéutico, y pregúntales si es seguro tomar BIKTARVY junto con tus otros medicamentos.



BIKTARVY®
bictegravir 50mg/emtricitabine 200mg/
tenofovir alafenamide 25mg tablets

Haz clic para consultar la Información Importante acerca de BIKTARVY®, que incluye advertencias importantes sobre BIKTARVY, en la página 22.

Mantenerte en tratamiento es importante para tu salud

Una vez que reinicies el tratamiento, tomar tu medicamento según lo recetado para alcanzar niveles indetectables es una de las cosas más importantes que puedes hacer por tu salud. Si tienes dudas sobre cómo tomar tus medicamentos para el VIH, habla honestamente con tu proveedor de atención médica y cualquier otro profesional de la salud que te brinde apoyo.



Haz que el tratamiento sea parte de tu rutina diaria. Sé consistente con el horario en el que tomas tu tratamiento y configura un recordatorio en tu teléfono. Solicita a tu farmacia que te ayude a configurar los reabastecimientos automáticos de tu medicamento recetado.



Únete a un grupo de apoyo. Además de tus familiares y amigos, existen grupos de apoyo para el VIH. Estos pueden ayudar a las personas que viven con VIH a compartir experiencias y perspectivas, luchar contra los estigmas y manejar los sentimientos de aislamiento o depresión.



No dudes en pedir ayuda. Si ocurre algo inesperado que te cause dificultad para seguir el tratamiento, ponte en contacto con tu equipo de atención médica para el VIH. Ellos están listos para ayudarte a superar cualquier obstáculo que se presente durante tu tratamiento.



Descubre cómo puedes reiniciar tu tratamiento con BIKTARVY® Cuando estés listo, pregúntale a tu proveedor de atención médica si BIKTARVY podría ser el tratamiento adecuado para ti.



BIKTARVY®
bictegravir 50mg/emtricitabine 200mg/
tenofovir alafenamide 25mg tablets

Theron

Se cambió a BIKTARVY® en 2020,
aún mantiene niveles indetectables



Este no es el tamaño real
(15 mm x 8 mm)

¿Qué le debo informar a mi proveedor de atención médica antes de tomar BIKTARVY®? (continuación)

- ♦ **Si estás embarazada** o planeas quedar embarazada. Informa a tu proveedor de atención médica si quedas embarazada mientras estás tomando BIKTARVY.
- ♦ **Si estás amamantando** (lactando) o planeas amamantar. Habla con tu proveedor de atención médica sobre los riesgos de amamantar durante el tratamiento con BIKTARVY.

Se recomienda que informes a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) sobre los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta. Visita www.fda.gov/medwatch o llama al 1-800-FDA-1088.

Haz clic para consultar la Información Importante acerca de BIKTARVY®, que incluye advertencias importantes sobre BIKTARVY, en la página 22.

Creado para **tu camino**

La combinación de los 3 potentes medicamentos de BIKTARVY® fue diseñada para atacar el virus y trabajar en conjunto para reducir la cantidad de VIH en tu sangre hasta niveles indetectables.

DAR POTENCIA A LO MÁS IMPORTANTE



Cuando se toma según lo recetado, BIKTARVY puede ayudar a reducir la cantidad de VIH en la sangre hasta lograr niveles indetectables.




Podrías empezar a tomar BIKTARVY en cuanto te diagnostiquen y comenzar el proceso de tratamiento. O bien, si estás cambiando de tratamiento, BIKTARVY podría ser una opción para ti.

Habla con tu proveedor de atención médica para comprobar si **BIKTARVY es la opción adecuada para ti.**



BIKTARVY®

bictegravir 50mg/emtricitabine 200mg/
tenofovir alafenamide 25mg tablets



Dimitri

Empezó a tomar BIKTARVY® en 2018,
aún mantiene niveles indetectables

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Qué es lo más importante que debo saber acerca de BIKTARVY®?

BIKTARVY podría causar efectos secundarios graves:

- ◆ **Empeoramiento de la hepatitis B (VHB).** Tu proveedor de atención médica te hará la prueba de VHB. Si tienes VIH-1 y VHB y dejas de tomar BIKTARVY, tu VHB podría empeorar repentinamente. No dejes de tomar BIKTARVY sin hablar primero con tu proveedor de atención médica, ya que deberá monitorear tu salud y podría darte un medicamento para tu VHB.

Haz clic para consultar la Información Importante acerca de **BIKTARVY®**, que incluye advertencias importantes sobre BIKTARVY, en la [página 22](#).

Defenderse contra la resistencia es importante

Tomar medicamentos con una barrera alta a la resistencia y cumplir el tratamiento puede ayudar a defenderse contra el desarrollo de resistencia al fármaco.

¿QUÉ ES LA RESISTENCIA?

A veces, el VIH puede cambiar o mutar. Este cambio puede hacer que un medicamento no funcione tan bien. Esto se denomina *mutación de resistencia* o *resistencia al tratamiento*. Cuando el VIH se hace resistente, es más difícil de tratar. La resistencia es permanente e irreversible, lo que significa que se podrían limitar las opciones de tratamiento futuras. Por eso es importante entender las formas de reducir el riesgo de resistencia.

¿CÓMO SE HACE RESISTENTE EL VIH?

- ♦ **Desde el principio:** Cuando alguien contrae el VIH, es posible que el virus del VIH ya sea resistente a ciertos medicamentos. Esto se denomina “resistencia preexistente”, y significa que algunos tratamientos no funcionarán incluso antes de usarlos.
- ♦ **A lo largo del tiempo:** Si el VIH cambia una vez iniciado el tratamiento, puede volverse resistente y afectar qué tan bien funciona el tratamiento. Tu carga viral puede aumentar si no tomas los medicamentos para el VIH según lo recetado, si te saltas dosis o si interrumpes el tratamiento. Esta es una forma de desarrollar resistencia al fármaco.

Asegúrate de tomar el tratamiento según lo recetado, porque los niveles bajos del medicamento en la sangre pueden hacer que sea más fácil que el virus del VIH mute o cambie.

La importancia de una barrera alta a la resistencia

Los medicamentos tienen barreras de resistencia de bajas a altas, que nos indican cuántas mutaciones tendrían que producirse para que el medicamento deje de funcionar. **Que un medicamento tenga una barrera alta a la resistencia significa que puede hacer efecto incluso después de varias mutaciones.** Una defensa importante contra la resistencia al fármaco consiste en elegir un tratamiento con **una barrera alta a la resistencia** y tomarlo exactamente según lo recetado por tu proveedor de atención médica.

Asegúrate de hablar sobre la resistencia con tu proveedor de atención médica. Puede ayudarte a entender por qué son importantes las barreras a la resistencia.



Las personas destacadas son compensadas por Gilead.



BIKTARVY®

bictegravir 50mg/emtricitabine 200mg/
tenofovir alafenamide 25mg tablets

Haz clic para consultar la Información Importante acerca de BIKTARVY®, que incluye advertencias importantes sobre BIKTARVY, en la página 22.

Cero casos de resistencia durante 5 años



Resistencia

Ninguno de los adultos nuevos en el tratamiento desarrolló resistencia al fármaco de BIKTARVY® durante 5 años de ensayos clínicos.



BIKTARVY, que contiene una combinación única de medicamentos, incluido el bictegravir, proporciona una barrera alta a la resistencia.

Tomar un tratamiento con una barrera alta a la resistencia, como BIKTARVY, y tomar el medicamento según lo recetado puede ayudar a prevenir la resistencia al fármaco.

¿Quiénes no deben tomar BIKTARVY®?

No tomes BIKTARVY si tomas:

- ◆ dofetilida
- ◆ rifampicina
- ◆ cualquier otro medicamento para tratar el VIH-1

¿Cuáles son los otros posibles efectos secundarios de BIKTARVY?

Los efectos secundarios graves de BIKTARVY también podrían incluir los siguientes:

- ◆ **Cambios en tu sistema inmunológico.** Tu sistema inmunológico podría fortalecerse y comenzar a combatir infecciones que podrían haber estado ocultas en tu cuerpo. Informa a tu proveedor de atención médica si tienes algún síntoma nuevo después de comenzar a tomar BIKTARVY.



BIKTARVY®

bictegravir 50mg/emtricitabine 200mg/
tenofovir alafenamide 25mg tablets



Inicia la conversación con tu proveedor de atención médica sobre por qué es importante la resistencia.

Hugo

Toma BIKTARVY® desde hace 6 años



Haz clic para consultar la Información Importante acerca de BIKTARVY®, que incluye advertencias importantes sobre BIKTARVY, en la página 22.

Puede seguir **funcionando**, aunque el VIH haya cambiado o mutado

Se ha demostrado que BIKTARVY® sigue funcionando en los ensayos clínicos incluso cuando el VIH ha cambiado de ciertas maneras.

Un estudio de BIKTARVY incluyó a más de 560 adultos, algunos de los cuales tenían un virus del VIH con una mutación de resistencia llamada M184V/I.

- ♦ Las personas en el estudio cambiaron o continuaron su tratamiento actual. 284 se cambiaron de su tratamiento a BIKTARVY y 281 mantuvieron o cambiaron su tratamiento a DESCOVY® (emtricitabina, tenofovir alafenamida) + TIVICAY® (dolutegravir) durante un período de 1 año.
- ♦ De los adultos que se cambiaron a BIKTARVY, 47 de 284 tenían un virus del VIH que había cambiado de cierta manera (una mutación llamada M184V/I), por lo que era resistente a la emtricitabina, un medicamento de BIKTARVY.
- ♦ El punto cronológico de 1 año demostró que la mayoría de los adultos que reemplazaron su tratamiento actual por BIKTARVY y tomaron el tratamiento según lo recetado mantuvieron niveles indetectables.

BIKTARVY puede ayudar a adultos con un virus que ha cambiado de cierta manera (una mutación llamada M184V/I), que es resistente a la emtricitabina, un medicamento de BIKTARVY, a mantener niveles indetectables. Antes de tomar BIKTARVY, tu proveedor de atención médica debe determinar que cumples con ciertos requisitos.

Cero casos de resistencia

a BIKTARVY durante 1 año, incluidas aquellas personas con VIH que tenían una mutación de resistencia.



BIKTARVY®

bictegravir 50mg/emtricitabine 200mg/
tenofovir alafenamide 25mg tablets



Denise

Se cambió a BIKTARVY® en 2019, aún mantiene niveles indetectables

Los efectos secundarios graves de BIKTARVY® también podrían incluir los siguientes: (continuación)

- ♦ **Problemas renales, incluyendo insuficiencia renal.** Tu proveedor de atención médica debe realizarte análisis de sangre y orina para controlar tus riñones. Si desarrollas problemas renales nuevos o que empeoran, tu proveedor de atención médica podría indicarte que dejes de tomar BIKTARVY.
- ♦ **Demasiado ácido láctico en la sangre (acidosis láctica),** que es una emergencia médica grave pero poco frecuente y que puede provocar la muerte. Informa a tu proveedor de atención médica de inmediato si tienes estos siguientes síntomas: debilidad o más cansancio que lo habitual, dolor muscular inusual, dificultad para respirar o respiración acelerada, dolor estomacal con náuseas y vómitos, manos y pies fríos o azulados, mareos o aturdimiento, o palpitaciones o latidos anormales.

Haz clic para consultar la Información Importante acerca de BIKTARVY®, que incluye advertencias importantes sobre BIKTARVY, en la página 22.

Un perfil de **seguridad** establecido

<1% MENOS DEL 1 % DE LOS ADULTOS QUE ERAN NUEVOS EN EL TRATAMIENTO DEJARON DE TOMAR BIKTARVY® DEBIDO A EFECTOS SECUNDARIOS RELACIONADOS#


- ◆ Menos del 1 % de los adultos que eran nuevos en el tratamiento y que comenzaron a tomar BIKTARVY al inicio de los ensayos clínicos dejaron de tomar BIKTARVY debido a efectos secundarios relacionados a lo largo de 5 años.
- ◆ En ensayos clínicos en adultos que vivían con VIH, que eran nuevos en el tratamiento y que comenzaron a tomar BIKTARVY al inicio de los ensayos clínicos, **ninguno dejó de tomar BIKTARVY debido a efectos secundarios relacionados con los huesos, los riñones o el hígado** a lo largo de 5 años.

De los pacientes que comenzaron a tomar BIKTARVY al inicio de los ensayos clínicos, los efectos secundarios más comunes de BIKTARVY a lo largo de 5 años, que se experimentaron en al menos el 5 % de las personas de cualquiera de los estudios, fueron diarrea, dolor de cabeza y náuseas.

En general, el perfil de seguridad en los ensayos clínicos en personas que se cambiaron a BIKTARVY, que incluye a aquellas con la mutación M184V/I, fue similar al de las personas que eran nuevas en el tratamiento con BIKTARVY.

Estos no son los únicos efectos secundarios de BIKTARVY. Informa a tu proveedor de atención médica si presentas efectos secundarios que te molestan o no desaparecen.

#Los efectos secundarios, también conocidos como eventos adversos relacionados con BIKTARVY, que llevaron a los pacientes a dejar de tomar BIKTARVY durante los estudios de 5 años de duración, fueron: aumento de peso; dolor en el pecho; hinchazón; problemas del sueño, indigestión, cefalea tensional, estado de ánimo deprimido; insomnio y depresión.



Los efectos secundarios graves de BIKTARVY® también podrían incluir los siguientes: (continuación)

- ◆ **Problemas hepáticos graves**, que en casos poco frecuentes pueden provocar la muerte. Informa a tu proveedor de atención médica de inmediato si tienes estos síntomas: color amarillento en la piel o la parte blanca de los ojos, orina oscura “color té”, heces claras, pérdida del apetito durante varios días o más, náuseas o dolor en la región estomacal.

Los efectos secundarios más comunes de BIKTARVY en estudios clínicos fueron diarrea (6 %), náuseas (6 %) y dolor de cabeza (5 %). Informa a tu proveedor de atención médica si tienes efectos secundarios que te causan malestar o no desaparecen.



Melanie

Se cambió a
BIKTARVY® en 2018,
aún mantiene niveles
indetectables

Las personas destacadas son compensadas por Gilead.



BIKTARVY®

bictegravir 50mg/emtricitabine 200mg/
tenofovir alafenamide 25mg tablets

Comprendiendo los posibles efectos secundarios

Cada uno de los efectos secundarios más comunes de BIKTARVY® en los estudios clínicos realizados durante 3 años fueron experimentados en al menos el 5 % de las personas. En estudios clínicos de 634 adultos que eran nuevos en el tratamiento para el VIH-1, los efectos secundarios más comunes fueron diarrea (6 %), náuseas (6 %) y dolor de cabeza (5 %). Cada uno de estos efectos secundarios comunes se experimentaron en al menos 1 de cada 20 personas (≥5 %).

Estos no son los únicos efectos secundarios de BIKTARVY. Informa a tu proveedor de atención médica si tienes efectos secundarios que te molestan o no desaparecen. **Se recomienda que informes a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) sobre los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta. Visita www.fda.gov/medwatch o llama al 1-800-FDA-1088.**

BIKTARVY también podría causar efectos secundarios graves, entre los que se incluyen:

- ◆ **Cambios en tu sistema inmunológico.** Tu sistema inmunológico podría fortalecerse y comenzar a combatir infecciones que podrían haber estado ocultas en tu cuerpo. Informa a tu proveedor de atención médica si tienes algún síntoma nuevo después de comenzar a tomar BIKTARVY.
- ◆ **Problemas renales, incluyendo insuficiencia renal.** Tu proveedor de atención médica debe realizarte análisis de sangre y orina para controlar tus riñones. Si desarrollas problemas renales nuevos o que empeoran, tu proveedor de atención médica podría indicarte que dejes de tomar BIKTARVY.
- ◆ **Demasiado ácido láctico en la sangre (acidosis láctica),** que es una emergencia médica grave pero poco frecuente y que puede provocar la muerte. Informa a tu proveedor de atención médica de inmediato si tienes estos síntomas: debilidad o más cansancio que lo habitual, dolor muscular inusual, dificultad para respirar o respiración acelerada, dolor estomacal con náuseas y vómitos, manos y pies fríos o azulados, mareos o aturdimiento, o palpitaciones o latidos anormales.
- ◆ **Problemas hepáticos graves,** que en casos poco frecuentes pueden provocar la muerte. Informa a tu proveedor de atención médica de inmediato si tienes estos síntomas: color amarillento en la piel o la parte blanca de los ojos, orina oscura “color té”, heces claras, pérdida del apetito durante varios días o más, náuseas o dolor en la región estomacal.

Pregunta a tu proveedor de atención médica si BIKTARVY es adecuado para ti y obtén más información en BIKTARVY.com/espanol.

Haz clic para consultar la Información Importante acerca de BIKTARVY®, que incluye advertencias importantes sobre BIKTARVY, en la página 22.

Colabora con tu proveedor de atención médica

Colabora con tu proveedor de atención médica para asegurarte de tener el plan de tratamiento que mejor se adapte a tus necesidades.

CÓMO COLABORAR CON TU PROVEEDOR



Mantén un diálogo abierto sobre tu salud y asegúrate de avisarle si algo cambia.



Pregúntale sobre cualquier otro medicamento o suplemento que tomas; incluso puedes pedirle a tu proveedor de atención médica o farmacéutico una lista de medicamentos que interactúan con BIKTARVY®.



Asegúrate de acudir a tus citas programadas regularmente.



Escribe con anticipación cualquier pregunta que puedas tener para tu proveedor, de modo que recuerdes hacerla durante la cita.

Haz clic en
[Biktaryv.com/espanol](https://biktaryv.com/espanol)
para obtener más
información.

BIKTARVY® puede afectar la forma en que funcionan otros medicamentos, y otros medicamentos pueden afectar la forma en que funciona BIKTARVY, lo que podría causar efectos secundarios graves. Algunos medicamentos también pueden hacer que la cantidad de BIKTARVY en tu cuerpo sea demasiado baja para ayudar a mantener tus niveles de VIH-1 indetectables, y el virus puede hacerse resistente a BIKTARVY.

¿Qué le debo informar a mi proveedor de atención médica antes de tomar BIKTARVY®?

- ◆ **Informa a tu proveedor de atención médica tus antecedentes de salud** y si tienes o has tenido algún problema renal o hepático, incluido el virus de la hepatitis.
- ◆ **Informa a tu proveedor de atención médica todos los medicamentos que tomas**, incluidos los medicamentos de venta con y sin receta, los antiácidos, los laxantes, las vitaminas y los suplementos herbales. Haz una lista de tus medicamentos y muéstrasela a tu proveedor de atención médica y al farmacéutico, cuando te den un medicamento nuevo.
- ◆ **No empieces a tomar un medicamento nuevo sin decírselo a tu proveedor de atención médica.** Tu proveedor de atención médica puede decirte si es seguro tomar BIKTARVY con otros medicamentos. Puedes pedirle a tu proveedor de atención médica o farmacéutico una lista de los medicamentos que interactúan con BIKTARVY.

¿Qué ocurre si estoy embarazada o amamantando, o si planeo quedar embarazada o amamantar?

- ◆ **Informa a tu proveedor de atención médica si estás embarazada** o planeas quedar embarazada mientras tomas BIKTARVY.
- ◆ **Si estás amamantando (lactando)** o planeas amamantar, habla con tu proveedor de atención médica sobre los riesgos de amamantar durante el tratamiento con BIKTARVY.
- ◆ **Si estás embarazada y tomas suplementos o antiácidos que contienen aluminio, magnesio, hierro o calcio**, habla con tu proveedor de atención médica sobre cómo tomar BIKTARVY junto con estos suplementos o antiácidos.

¿Qué debo hacer si tomo demasiado?

Si tomas demasiado BIKTARVY, llama a tu proveedor de atención médica o ve inmediatamente a la sala de emergencias del hospital más cercano.

¿Qué debo hacer si se me acaban los medicamentos?

Cuando te quede poco del suministro de BIKTARVY, pide más a tu proveedor de atención médica o a tu farmacia. Esto es muy importante porque la cantidad de virus en la sangre podría aumentar si se deja de tomar el medicamento, aunque sea por poco tiempo. El virus podría desarrollar resistencia a BIKTARVY y volverse más difícil de tratar.



BIKTARVY®

bictegravir 50mg/emtricitabine 200mg/
tenofovir alafenamide 25mg tablets

Haz clic para consultar la Información Importante acerca de **BIKTARVY®**, que incluye advertencias importantes sobre BIKTARVY, en la página 22.

No hay nadie como tú. Por eso, **tú** vienes primero.

Con el tratamiento del VIH, uno de los objetivos principales es alcanzar y mantener niveles indetectables. Pero también es importante que pienses en tu salud y bienestar generales.

Estas son algunas formas de ayudarte a mantenerte en el tratamiento y cuidar tu salud general:

- ♦ **Programa recordatorios y automatiza tareas:** Usa tu teléfono para programar recordatorios diarios y establecer resurtidos automáticos de tus medicamentos de venta con receta para asegurarte de nunca saltarte una dosis.
- ♦ **Mantente conectado:** Mantén conversaciones habituales con tu proveedor de atención médica y tu(s) pareja(s) para abordar cualquier duda o preocupación sobre tu tratamiento.
- ♦ **Genera una red de cuidado:** Apóyate en tus amistades y familiares para que te animen.
- ♦ **Céntrate en tu salud general:** Haz elecciones saludables para tu salud física, como seguir una dieta equilibrada, hacer ejercicio físico, evitar la nicotina y otras.
- ♦ **Apoya tu salud mental:** Concéntrate en tu salud mental y emocional. Para encontrar apoyo y recursos, visita [BIKTARVY.com/espanol](https://www.biktarmv.com/espanol)



Cada paso que das es un paso hacia una vida saludable con VIH. Habla con tu proveedor de atención médica sobre cómo incorporar estas prácticas a tu vida cotidiana.

“Comienza el tratamiento. Sigue el tratamiento. Y cuídate”.

Nikki

Se cambió a
BIKTARVY® en 2018,
aún mantiene niveles
indetectables



BIKTARVY®

bictegravir 50mg/emtricitabine 200mg/
tenofovir alafenamide 25mg tablets

Haz clic para consultar la Información Importante acerca de BIKTARVY®, que incluye advertencias importantes sobre BIKTARVY, en la página 22.

No permitas que el costo se interponga en tu camino

Con o sin seguro, el programa Advancing Access® de Gilead podría ayudarte.



Si eres elegible, Advancing Access® podría ayudarte a reducir el copago a tan poco como \$0**. Si no tienes seguro, podrías recibir BIKTARVY® de forma gratuita si cumples los requisitos del programa de Asistencia al paciente Advancing Access de Gilead.

El 90 % de las personas que usan la Tarjeta del cupón de copago Advancing Access de Gilead pagan \$0 al mes por BIKTARVY.

Fuente: Programa de copago Advancing Access de Gilead, de enero de 2023 a octubre de 2024.

Los especialistas de Advancing Access pueden ayudarte a comprender los costos de tu seguro médico y de los medicamentos de Gilead.

Para obtener más información, visita [GileadAdvancingAccess.com](https://www.gileadadvancingaccess.com) o llama al 1-800-226-2056, de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 8:00 p. m., hora del este (ET).

Llama a la línea directa y pide hablar con un representante de habla hispana.

**La ayuda de cupones de copago sólo está disponible para pacientes con seguro comercial que sean elegibles. Podrían aplicarse restricciones adicionales. Oferta sujeta a cambios. Para consultar todos los términos y condiciones, visita www.gileadadvancingaccess.com/copay-coupon-card. Esto no es un seguro médico. Sólo se acepta en las farmacias participantes.



Haz clic para consultar la Información Importante acerca de BIKTARVY®, que incluye advertencias importantes sobre BIKTARVY, en la página 22.



Maricela

Se cambió a BIKTARVY® en 2018, aún mantiene niveles indetectables

Para más información y recursos, haz clic en [BIKTARVY.com/espanol](https://www.biktarvy.com/espanol).



BIKTARVY®

bictegravir 50mg/emtricitabine 200mg/
tenofovir alafenamide 25mg tablets



Las personas destacadas son compensadas por Gilead.

Conoce a personas extraordinarias

que toman BIKTARVY®. Escucha sus historias y obtén
más información sobre BIKTARVY visitando
BIKTARVY.com/espanol/pacientes reales.

Haz clic para consultar la Información Importante acerca de BIKTARVY®, que incluye advertencias importantes, en la página 22.



BIKTARVY, el Logotipo de BIKTARVY, ADVANCING ACCESS, GILEAD, el Logotipo de GILEAD y GSI son marcas comerciales de Gilead Sciences, Inc. o sus compañías relacionadas. Todas las demás marcas a las que se hace referencia aquí son propiedad de sus respectivos dueños.

© 2025 Gilead Sciences, Inc. Todos los derechos reservados. US-BVYC-0980 12/25



BIKTARVY®

bictegravir 50mg/emtricitabine 200mg/
tenofovir alafenamide 25mg tablets

(bik-TAR-vee)

INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE SOBRE BIKTARVY

BIKTARVY podría causar efectos secundarios graves, que incluyen los siguientes:

- **Empeoramiento de la hepatitis B (VHB).** Tu proveedor de atención médica te hará la prueba de VHB. Si tienes VIH-1 y VHB, tu VHB podría empeorar repentinamente si dejas de tomar BIKTARVY. No dejes de tomar BIKTARVY sin hablar primero con tu proveedor de atención médica, ya que deberá monitorear tu salud de forma regular durante varios meses y podría darte un medicamento para tu VHB.

ACERCA DE BIKTARVY

BIKTARVY es un medicamento de venta con receta completo de 1 pastilla que se toma una vez al día, y que se usa para tratar el VIH-1 en adultos y niños que pesan al menos 31 libras (14 kg). Puede usarse ya sea en personas que nunca han tomado medicamentos para el VIH-1 antes o en personas que recibieron medicamentos para el VIH-1 anteriormente, o para reemplazar sus medicamentos actuales para el VIH-1, y cuyo proveedor de atención médica determina que cumplen con ciertos requisitos.

BIKTARVY no cura el VIH-1 ni el SIDA. El VIH-1 es el virus que causa el SIDA.

NO tomes BIKTARVY si también tomas un medicamento que contiene:

- dofetilida
- rifampicina
- cualquier otro medicamento para tratar el VIH-1

ANTES DE TOMAR BIKTARVY

Informa a tu proveedor de atención médica todas tus afecciones médicas, incluido si tú:

- Tienes o has tenido algún problema renal o hepático, incluida la hepatitis.
- Estás embarazada o planeas quedar embarazada.
- Estás amamantando (lactando) o planeas amamantar. Habla con tu proveedor de atención médica sobre los riesgos de amamantar durante el tratamiento con BIKTARVY.

Informa a tu proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que tomas:

- Elabora una lista que incluya todos los medicamentos de venta con y sin receta, antiácidos, laxantes, vitaminas y suplementos herbales, y muéstrasela a tu proveedor de atención médica y al farmacéutico.
- Pregúntale a tu proveedor de atención médica o al farmacéutico sobre los medicamentos que interactúan con BIKTARVY.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Esto es sólo un breve resumen de información importante sobre BIKTARVY® y no sustituye la conversación con tu proveedor de atención médica sobre tu afección y tu tratamiento.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE BIKTARVY

BIKTARVY podría causar efectos secundarios graves, que incluyen los siguientes:

- Aquellos que se describen en la sección “Información muy importante sobre BIKTARVY”.
- Cambios en tu sistema inmunológico.
- Problemas renales nuevos o peores, incluida la insuficiencia renal.
- Demasiado ácido láctico en la sangre (acidosis láctica), que es una emergencia médica grave pero poco frecuente y que puede provocar la muerte. Informa a tu proveedor de atención médica de inmediato si tienes estos síntomas: debilidad o más cansancio que lo habitual, dolor muscular inusual, dificultad para respirar o respiración acelerada, dolor estomacal con náuseas y vómitos, manos y pies fríos o azulados, mareos o aturdimiento, o palpitaciones o latidos anormales.
- Problemas hepáticos graves, que en casos poco frecuentes pueden provocar la muerte. Informa a tu proveedor de atención médica de inmediato si tienes estos síntomas: color amarillento en la piel o la parte blanca de los ojos, orina oscura “color té”, heces claras, pérdida de apetito durante varios días o más, náuseas o dolor en la región estomacal.
- **Los efectos secundarios más comunes de BIKTARVY** en estudios clínicos fueron diarrea (6 %), náuseas (6 %) y dolor de cabeza (5 %).

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de BIKTARVY. Informa a tu proveedor de atención médica de inmediato si tienes algún síntoma nuevo durante el tratamiento con BIKTARVY.

Tu proveedor de atención médica necesitará realizarte pruebas para monitorear tu salud antes y durante el tratamiento con BIKTARVY.

CÓMO TOMAR BIKTARVY

Toma BIKTARVY 1 vez cada día con o sin alimentos.

OBTÉN MÁS INFORMACIÓN

- Esto es sólo un breve resumen de la información importante sobre BIKTARVY. Habla con tu proveedor de atención médica o farmacéutico para aprender más.
- Ingresa a [BIKTARVY.com/espanol](https://www.biktarvy.com/espanol) o llama al 1-800-GILEAD-5.
- Si necesitas ayuda para pagar tu medicamento, visita [BIKTARVY.com/espanol](https://www.biktarvy.com/espanol) para obtener información sobre el programa de asistencia.



BIKTARVY, el Logotipo de BIKTARVY, GILEAD y el Logotipo de GILEAD son marcas comerciales de Gilead Sciences, Inc., o sus compañías relacionadas.
Fecha de la versión: diciembre de 2025
© 2025 Gilead Sciences, Inc. Todos los derechos reservados. US-BVYC-0980 12/25